



Leerpunten

Groepsnaam : Zwolle 3

Onderwerp : Maag-, Darm- en Leverziekten

Datum	: 2 april 2014
Huisarts presentator	: De heer J.J. de Jonge
Specialist presentator	: De heer E.J. van der Wouden
Aantal ingevulde formulieren	: 9
Aanwezig (van de 12)	: 12
Cijfer gemiddeld	: 7,9
Opkomst	: 100 %

1. Hoger doseren PPI voordat gastroscopie nodig is
2. De huidige generatie MDL-artsen denkt wel gezond na
3. Hoofdpijn = bijwerking omeprazol
4. Duur en ophogen van PPI-gebruik (2x)
5. Risicofactoren HVZ = risicofactoren CRC (6x)
6. Familieanamnese pas belast voor CRC bij tenminste één 1^e graads familielid
7. Jaarlijks PPI evalueren
8. Indicatie voor gastroscopie is klein
9. PPI afbouwen via ranitidine
10. Twee maanden opbouwen PPI
11. Beleid Lynch t.a.v. FAP
12. Hoofdpijn bijwerking PPI
13. PPI ophogen, effect 2-3 maanden afwachten
14. Ranitidine = eigenlijk best oké

Opmerkingen betreffende inhoud, vorm of presentatie:
Prima inhoud in combinatie met uitstekende sfeer;

Wensen: