

## Leerpunten

**Groepsnaam : Hattem/ Heerde/ Wapenveld**

**Onderwerp : Nierfunctiestoornissen**

Datum	: 28 september 2015
Huisarts presentator	: De heer J.F.J. Morgenstern
Specialist presentator	: Mevrouw H.P.E. Peters
Aantal ingevulde formulieren	: 10
Aanwezig (van de 18)	: 11
Cijfer gemiddeld	: 8,5
Opkomst	: 61 %

1. Trimethoprim kan kreatinine stijging geven (3x)
2. Furosemide bij voorkeur 2 dd doseren
3. Over/onderschatting klaring → berekening urine kreatinine via 24-uurs urine (2x)
4. Albumine-kreat ratio beste onderscheider voor micro/macro albuminurie (2x)
5. Gewicht/spiermassa meenemen MDRD (5x)
6. Meer inzicht in wanneer wel of niet verwijzen
7. Dysmorphe erythrocyten; denk aan glomerulaire problemen
8. Tubulaire secretie
9. Telenefrologie
10. Micro-albuminurie niet met dipstick
11. Endogene klaring zelf bepalen
12. Bij nierfunctiestoornis mag wel normale oplaaddosis
13. Altijd albumine-kreat ratio als maat nemen voor eiwitverlies in urineportie

### **Opmerkingen betreffende inhoud, vorm of presentatie:**

Zeer leerzaam; leuk (2x); leuke en zinvolle bijscholing, rustige gespreksvoering; nuttig

### **Wensen:**

Frequently Asked Questions bij telenefrologie