



## Leerpunten

**Groepsnaam : Oldebroek/ Wezep/ Inhaalgroep**  
**Onderwerp : Maag-, Darm- en Leverziekten**

Datum : 9 december 2015  
Huisarts presentator : Mevrouw N. Uit de Weerd  
Specialist presentator : De heer A.C. Poen  
Aantal ingevulde formulieren : 8  
Aanwezig (van de 8) : 8 (inhaalbijeenkomst)  
Cijfer gemiddeld : 8,3  
Opkomst : 100 %

1. Redenen afbouw PPI, rebound voorkomen
2. Waarom sedatie bij gastroscopie af te raden (2x)
3. Hoofdpijn; denk aan omeprazol (3x)
4. Na eradication H Pylori nog klachten: scopie
5. HP faecetest zeer specifiek
6. Faecetest na > 2 weken stop PPI
7. Half uur voor de maaltijd PPI beste effect (2x)
8. Spironolacton + NSAID = PPI indicatie mogelijk
9. Afbouwen omeprazol hoeft niet
10. Vooral reflux > maalox
11. Spironolacton valt onder categorie SSRI
12. Hp faecetest zinvol bij dyspepsie

**Opmerkingen betreffende inhoud, vorm of presentatie:**  
Leuke interactie;

**Wensen:**