

Leerpunten

Groepsnaam : Zwolle 1

Onderwerp : Plastische chirurgie

Datum	: 8 maart 2016
Huisarts presentator	: De heer J.J. de Jonge
Specialist presentator	: De heer M.L.E. Overgoor
Aantal ingevulde formulieren	: 10
Aanwezig (van de 15)	: 12
Cijfer gemiddeld	: 8,5
Opkomst	: 80 %

1. Naaldfascietomie goed alternatief voor Dupuytren behandeling
2. 4-6 maanden na trauma Mallet spalk nog zinvol (5x)
3. Carpaal tunnel: continue pijn aanwezig → direct verwijzing PCH (2x)
4. Bandletsel pols aan denken bij fors trauma, aanhoudend pijn (2x)
5. Nabehandeling mallet-vinger: nog 2 weken spalk + oefenen
6. S-L ligament letsel bij aanhoudend pijn, dorsaal pols, OK indicatie (3x)
7. Injecteren komt ook weer niet zo precies
8. Knijpfoto bij vermoeden S-L letsel (2x)
9. Techniek injecties
10. Injecteren tot het bot
11. Zes weken Mallet spalk minimaal
12. Dupuytren bij 30° verwijzen

Opmerkingen betreffende inhoud, vorm of presentatie:

Injecteren zinvol; erg leuk (2x), enthousiast (2x), leerzaam (2x); leuk om praktisch te oefenen met injecteren (2x); hoop de drempel om te gaan prikken dit keer wel over ga! goede Interline, met name ook de injectietechnieken → drempelverlagend; leuke afwisseling; goede hoeveelheid casus (niet te veel, niet te weinig); ga nu zelf prikken ook!

Wensen: