

Leerpunten

Groepsnaam : Zwolle 1
Onderwerp : Antistolzorg

Datum : 8 november 2016
Huisarts presentator : De heer R. Jurriaans
Specialist presentator : De heer J.J.C.M. van de Leur
Aantal ingevulde formulieren : 6
Aanwezig (van de 15) : 9
Cijfer gemiddeld : 7,8
Opkomst : 60 %

1. Door ziekte stress, anorexia e.d. kan INR stijgen, maar vooral hartfalen geeft doorschieten INR (3x)
2. Bij DOAC gebruik vooral nierfunctie belangrijk
3. Op de post staat een INR meter
4. Vaker TEC bellen / overleg (3x)
5. Raadplegen TEC kan ook voor DOAC gebruik
6. Tandartsen hebben een eigen richtlijn voor antistolling
7. Nierfunctiestoornis (diarree!) – DOAC dosering aanpassen
8. Bij gebruik DOAC 1 x per jr. NF bep. (diarree + DOAC lab NF bep)
9. INR 2.5 = 2,5 x zo lang bloeden (2x)

Opmerkingen betreffende inhoud, vorm of presentatie:

(Zoals altijd) zeer leerzaam (2x); leuk aan de hand van casussen; nuttig, praktisch; goed, voldoende interactief

Wensen: