



Leerpunten

Groepsnaam : Zwolle 3

Onderwerp : Antistolzorg

Datum	: 9 november 2016
Huisarts presentator	: De heer J.M. van de Riet
Specialist presentator	: De heer J.J.C.M. van de Leur
Aantal ingevulde formulieren	: 7
Aanwezig (van de 13)	: 8
Cijfer gemiddeld	: 8,2
Opkomst	: 62 %

1. Bij jicht en acenocoumarol cave INR
2. Overleg met TEC kan altijd (3x)
3. DOAC: houd nierfunctie in het oog
4. De tandarts beschikt over een ACTA Protocol Antistolling
5. DOAC & diarree, denk aan nierfunctie
6. INR > 6 + hevige hematurie of INR > 8 → vit. K
7. Niet zomaar Kenacort in de schouder bij VKA
8. Verwijzen naar TEC via ZorgDomein : cardiologie-ritmestoornis
9. Goed opletten bij patiënten met antistolling (ziek, jicht, stress, dec.cordis)
10. Ongewenste combinatie : ibuprofen en ascal
11. Ook bij intramusculaire / intra-articulaire injectie overleg met TEC
12. DOAC's minder risico op CVA

Opmerkingen betreffende inhoud, vorm of presentatie:

Wensen: