



Leerpunten

Groepsnaam : Kampen 2/ IJsselmuiden

Onderwerp : Antistolzorg

Datum : 23 mei 2017
Huisarts presentator : De heer R.M. Oosterhout
Specialist presentator : De heer J.J.C.M. van de Leur
Aantal ingevulde formulieren : 9
Cijfer : 8,1

Totaal van Kampen 1 en Kampen 2/IJsselmuiden:

Aanwezig (van de 19 + 10) : 23
Opkomst : 79 %

1. Corticosteroïdeninjecties best risico op bloeding bij mensen met acenocoumarol of DOAC
2. (Jicht +)pijn stijging INR , 32x)
3. Decompensatio cordis belangrijkste reden voor INR stijging (2x)
4. Eigenschappen VKA etc.
5. Interactie pijn/medicatie plus INR
6. Ascal niet samen met ibuprofen (2x)
7. Bij bloeding evt. Acenocoumarol omzetten naar fraxi i.v.m. verminderd bloedingsrisico (2x)
8. Bij INR 2,5 blijf je bloeden, bij INR 1,5 kun je zelf stollen
9. NOAC cave renale klaring
10. HA niet verantwoordelijk voor start-receptuur DOAC
11. Oorzaken ontregelen INR
12. INR >8 bij bloeding altijd Vit. K geven
13. DOAC's niet bij GFR < 30

Opmerkingen betreffende inhoud, vorm of presentatie:

Heel praktisch, goed; meer nadruk op NOAC verwacht, minder reclame voor TEC; relevante casus; prima; leerzaam, goed.

Wensen: